

Lisa 1. Ambulatoorseste bakteriaalsete infektsioonide ravimite valik, annused ja kestus

HINGAMISTEEDE INFEKTSIOONID				
	Täiskasvanu		Laps*	
	Esimene valik	Penitsilliiniallergia	Esimene valik	Penitsilliiniallergia
Tonsilliit	Fenoksümetüülpenitsilliin	Klaritromütsiin	Fenoksümetüülpenitsilliin	Klaritromütsiin
Annus	2 miljonit RÜ × 2	500 mg × 2	< 27 kg: 400 000 RÜ × 3 ööpäevas > 27 kg: 800 000 RÜ × 3 ööpäevas	15 mg/kg ööpäevas jagatuna kaheks annuseks
Kestus	5 päeva		5 päeva	
Äge bakteriaalne rinosinusiit	Amoksitsilliin	Klaritromütsiin	Amoksitsilliin	Klaritromütsiin
Annus	500 mg × 3	500 mg × 2	40–60 mg/kg ööpäevas jagatuna kolmeks annuseks	15 mg/kg ööpäevas jagatuna kaheks annuseks
Kestus	5 päeva	5 päeva	5 päeva	5 päeva

Äge keskkõrvapõletik	Amoksitsilliin	Klaritromütsiin	Amoksitsilliin	Klaritromütsiin
Annus	500 mg × 3	500 mg × 2	40–60 mg/kg ööpäevas jagatuna kolmeks annuseks	15 mg/kg ööpäevas jagatuna kaheks annuseks
Ravi kestus	5 päeva	5 päeva	5–7 päeva	5–7 päeva
Kopsupõletik	Amoksitsilliin	Doksütsükliin	Amoksitsilliin	Klaritromütsiin
Annus	750 mg × 3	200 mg × 1 esimesel päeval, edasi 100 mg × 1	40–60 mg/kg ööpäevas jagatuna kolmeks annuseks	15 mg/kg ööpäevas jagatuna kaheks annuseks
Kestus	5 päeva	5 päeva	5 päeva	5 päeva

KUSETEEDE INFEKTSIOONID

	Täiskasvanu		Laps*	
	Esimene valik	Neerufunktsiooni vähenemine (eGFR<45 mL/min/1,73m ²)	Esimene valik	Teine valik
Tsüstiit	Nitrofurantoiin	TMP-SMX	TMP-SMX	Nitrofurantoiin
Annus	50 mg × 3–4 ööpäevas	eGFR>30 mL/min/1,73m ² : 800/160 mg x 2 GFR<30 mL/min/1,73m ² : 400/80 mg x 2 eGFR<15mL/min/1,73m ² : väldi kasutamist	6–12 mg/kg ööpäevas jagatuna kaheks annuseks (TMPi järgi)	5–7 mg/kg ööpäevas jagatuna neljaks annuseks
Kestus	3 päeva		3–5 päeva	

	Esimene valik		Esimene valik	Penitsilliiniallergia
Püelonefriit	Tsiprofloksatsiin**	TMP-SMX	Amokitsilliin-klavulaanhape	TMP-SMX
Annus	500 mg × 2	800/160 mg × 2	30–40 mg/kg ööpäevas jagatuna kolmeks annuseks (amokitsilliini järgi)	6–12 mg/kg ööpäevas jagatuna kaheks annuseks (TMPi järgi)
Kestus	7 päeva (mehed 14 päeva)		7–10 päeva	

* > 40 kg kaaluval lapsel kasutatakse täiskasvanute annuseid, < 40 kg kaaluval lapsel kehakaalu alusel annuse määramisel ei ületata täiskasvanu annuseid.

** Mitte kasutada rasedatel ja eakatel.

Ravimite annused pärinevad konkreetsete ravimite omaduste kokkuvõttest (SPC) ja tunnustatud käsiraamatutest.

Soovitatud ravimid, mida kliinilistes küsimustes ei käsitletud, on valitud rahvusvaheliste ravijuhendite ja töörihma kliinilise kogemuse põhjal.