Lisa 1. HIV-testimine HIV-i sümptomite, HIV-iga seotud seisundite ja haiguste või HIV-i riskikäitumise korral

HAIGUSED JA SEISUNDID:

- korduv pneumoonia ühe aasta jooksul;
- Tuberkuloos (nii kopsu kui ka muude paikmete);
- äge või krooniline B-hepatiit ja C-hepatiit;
- *herpes zoster* alla 65-aastastel isikutel;
- dissemineeritud *herpes simplex* infektsioon;
- seksuaalsel teel levivad infektsioonid;
- generaliseerunud seeninfektsioonid;
- generaliseeritud tüükad ja nakkuslikud molluskid;
- ebaselge põhjusega leukopeenia või trombotsütopeenia kestusega üle 4 nädala;
- lümfoom;
- Kaposi sarkoom;
- emakakaela ja anaalpiirkonna vähk ja prekantseroossed seisundid;
- generaliseerunud seborroiline dermatiit/follikuliit;
- CMV retiniit.

SÜMPTOMID:

- palavik, millega kaasneb: kurguvalu, lööve, haavandid suus, lümfadenopaatia, lihas-, liigesvalu;
- järsk kaalulangus;
- öine higistamine;
- pidev kõhulahtisus.

RISKIRÜHMAD:

- narkootikume süstivad või süstinud inimesed;
- prostitutsiooni kaasatud inimesed;
- meestega seksivad mehed;
- eespool nimetatud inimeste sekspartnerid;
- inimesed, kellel on olnud vahekord HIV positiivse inimesega;
- inimesed, kellel on olnud mitu juhupartnerit ja kaitsmata vahekordi

TEOSTA HIV-TEST

NEGATIIVNE HIV-TEST

Selgita aknaperioodi võimalust ja võimaliku korduva testimise vajadust. Olulise HIV-i nakatumise riski korral soovita **PrEP**-i.

POSITIIVNE HIV-TEST

Suuna patsient koheselt **infektsioonhaiguste arsti** vastuvõtule. Kontrolli inimese vastuvõtule jõudmist.