

## Lisa 4. Ülemise õõnesveeni kompressiooni käsitus

### Ülemise õõnesveeni kompressioon

#### Kaebused:

- hingeldus
- näo ja kaela, ülakeha ja käte turse
- lämbumise tunne
- pea oleks nagu „paks“
- peavalu
- rindkere valu
- kõha
- düsfaagia
- kognitiivne häire
- hallutsinatsioonid
- krambid

#### Kliiniline pilt:

- torakalveenide laienemine
- kaelaveenide laienemine
- näo turse
- tahhüpnöe
- tsüanoos
- käte turse
- striidor
- kooma

#### Healoomuline (10%)

##### Põhjus:

- tsentraalveeni kateeter
  - südamestimulaator
- kiiritusravijärgne fibroos
  - struuma
- kopsutuberkuloos

- voodipeatsi tõstmine
- lisahapnik, kui patsient tunneb sellest leevendust
- põhjuse kõrvaldamine
- antikoagulatsioon madalmolekulaarse hepariiniga

#### Pahaloomuline (90%)

##### Põhjus:

- intratorakaalne primaarne kasvaja
  - 80% (kopsuvähk, mesoteliom)
    - mediastinaalne lümfadenopaatia (metastaasid, lümfoom)

- voodipeatsi tõstmine
  - lisahapnik, kui patsient tunneb sellest leevendust
  - deksametasoon
    - 16 mg x 1 (8 mg x 2) p.o., iv, jätkata 8 mg x 1 (4 mg x 2) p.o., iv hommikul ja lõunal
  - antikoagulatsioon madalmolekulaarse hepariiniga
- Onkoloogi konsultatsioon võimalike täiendavate ravivõtete suhtes (kiiritusravi, keemiaravi, stentimine)

Kui täiendavaid ravivõtteid ei ole võimalik rakendada või patsient on terminaales seisundis –  
**vaevuste leevendamine**

**Lühendid:** p.o. - suu kaudu; iv - intravenoosselt