

Lisa farmakoloogilise ravi skeemi basaalsuliin

ALUSTAMINE: alusta 10 TÜ/päevas **VÕI**
HbA1c < 8% (64 mmol/mol) 0,1–0,2 TÜ/kg/päevas **HbA1c > 8% (64 mmol/mol)** 0,2–0,3 TÜ/kg/päevas

TIITRIMINE:

- sea individuaalne paastuglukoosi eesmärväärtus (4,4–7,0 mmol/l)
- suurenda annust 2–4 TÜ võrra iga 1–2 korda nädalas

HÜPOGLÜKEEMIA: tee kindlaks põhjus, kui selge põhjus puudub **JA**
vere glükooisisaldus < 4,0 mmol/l vähenda 10–20% **vere glükooisisaldus < 2,2 mmol/l** vähenda 20–40%

NB! Vaata üle meditsiiniseadme kaardil glükomeetri testribade, lansettide ja süstenõelade hüvitamise tingimused

HbA1c on üle eesmärväärtuse JA
 paastuglukoos on eesmärväärtuses või
 basaalsuliini annus on > 0,5 TÜ/kg/päevas

Lisa üks kiiretoimelise insuliini süst
 enne suurimat toidukorda

Lisa GLP1 agonist

Mine üle seguinsuliinile 1–3 korda
 päevas

HbA1c üle eesmärväärtuse

kui ravi GLP1 agonistiga on
 vastunäidustatud, seda ei
 taluta või HbA1c on üle
 eesmärväärtuse mine üle
 mitmesüsteravile

Lisa ≥ 2 kiiretoimelise insuliini süsti
 enne toidukordi (intensiivne
 insuliinravi skeem)