

Autor(id):

Küsimus: Isikukaitsevahendeid võrreldes mitte kasutada isikukaitsevahendeid, et vähendada tervishoiutekkeste infektsioonide avaldumust?

Kontekst: 9. Kas tervishoiu-/hoolekodutöötajad peavad kasutama isikukaitsevahendeid või mitte, et vähendada tervishoiutekkeste infektsioonide avaldumust?

Bibliograafia:

Töendatuse astme hinnang							Uuritavate arv		Mõju		Töendatuse aste	Olulitus
Uuringute arv	Uuringukavand	Nihke töenäosus	Töenduse ebaköla	Töenduse kaudsus	Töenduse ebatäpsus	Muud kaalutlused	isikukaitsevahendeid	mitte kasutada isikukaitsevahendeid,	Suheline (95% CI)	Absoluutne (95% CI)		

Kinnaste universaalne kasutus, käte kontaminatsioon

4 ^{1,2,3,4,5}	jälgimisuurungud	väike ^a	väike	väike	suur ^{b,c}	puudub	3-s uuringus leiti, et tervishoiutöötatel, kes kandsid kindaid, saastusid käed oluliselt vähem, kui neil, kes ei kandnud. Hayden jt uuringus leiti, et tervishoiutöötajatel, kes kandsid ei kandnud, saastusid käed 37%-l vs 5%-l, kerg kandsid kindaid (86% erinevus). Pessoa-Silva jt uuringus leiti, et tervishoiutöötajatel, kes ei kandnud kindaid, saastusid käed 24,5 CFU/min (95% CI, 16,2 kuni 32,8 CFU/min; p < ,001) vs -1,9 CFU/min (95% CI, -11,5 kuni 7,7 CFU/min; p = 0,690) nendel kes kandsid. Morgan jt uuringus leiti, et kindad vähendasid MDR A.baumannii kandumist tervishoiutöötatajate kätele kaheksakordsest, 36,2%-lt 4,5%-le. Riskifaktorid MDR A.baumannii'ga kontamineerumiseks olid haavasidemete manipulatsioon (OR, 25,9 [95% CI, 3,1–208,8]) ja tehisliku hingamisteeaga manipulatsioon (OR, 2,1 [95% CI, 1,1–4,0]). Tenorio jt uuringus leiti, et riskifaktorid kinnaste saastumiseks VRE-ga oolid kontakti kestus patsiendi kehavedelikega, kõhulahtisuse esinemine patsiendil, keskmne VRE kolooniate hulk patsiendi nahal ja VRE-ga koloniseeritud patsiendi kehaosade hulk.	⊕OOO Väga madal	
------------------------	------------------	--------------------	-------	-------	---------------------	--------	---	--------------------	--

Kinnaste universaalne kasutus, CDI esinemissagedus

1 ^{6,7}	jälgimisuurungud	väike ^d	väike	väike	väike	puudub	Johnson jt randomiseerimata prospektiivses uuringus uuriti kinnaste kasutamise mõju tervishoiutekkese C.difficile infektsioonile (CDI). Jälgitati CDI esinemissagedust enne ja pärast sekkumist. Sekkumine viidi läbi ühes siseprofiliga ja ühes kirugilise profiliga osakonnas. Kontrolliks olid samaväärsed osakonnad, kus sekkumist läbi ei viitud. Sekkumiseks oli intensiivne koolitus CDI ja kinnaste kasutuse teemal, perioodilised koolitused, postrid ja iga patsiendi voodi juures kindakarp. Kontrollrühmas olid kindad palatist eemal laoruumis. Uuringus leiti tervishoiutekkese CDI vähenemine 7,7-lt 1000 väljakirjutatud patsiendi kohta enne kinnaste kasutamist 1,5-le 1000 patsiendi kohta peale kinnaste kasutuselevõttu (RR = 0,16; 95% CI = 0,01–0,98, P = 0,015). Kontrollgrupis esines samuti vähene CDI esinemissageduse langus, kuid see polnud statistiliselt oluline (5,7-lt 1000 väljakirjutatud patsiendi kohta 4,2-le, P = 0,20).	⊕⊕OO Madal	
------------------	------------------	--------------------	-------	-------	-------	--------	--	---------------	--

Kinnaste kasutus vs mitte, tervishoiutöötajad, kinnitatud H1N1, SARS, COVID-19

16 ^{8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24}	jälgimisuurungud	suur ^e	väike	väike	väike	tugev seos	625/3123 (20.0%)	354/1375 (25.7%)	šansside suhe (OR) 0,48 (0,31 kuni 0,75)	115 vähem / 1,000 (160 vähem kuni 51 vähem)	⊕⊕OO Madal	
--	------------------	-------------------	-------	-------	-------	------------	------------------	------------------	--	---	---------------	--

Kirurgilise maski kasutus vs ilma maskita, tavapopulatsioon+ tervishoiutöötajad, laboratoorselt kinnitatud respiratoorne viirus

6 ^{25,26,27,28,29,30,31}	randomiseeritud uuringud	suur ^f	väike ^g	suur ^h	suur ^b	puudub	36/1000 (3.6%)	40/1000 (4.0%)	suheline risk (RR) 0,91 (0,66 kuni 1,26)	4 vähem / 1,000 (14 vähem kuni 10 rohkem)	⊕OOO Väga madal	
-----------------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------	----------------	----------------	--	--	--------------------	--

Kirurgilise maski kasutus vs ilma maskita, tervishoiutöötajad, iseraporteeritud griplaadsed sümpтомid

2 ^{25,26,32}	randomiseeritud uuringud	suur ^{i,j}	väike ^k	väike	suur ^{b,l}	puudub	15/1000 (1.5%)	40/1000 (4.0%)	suheline risk (RR) 0,37 (0,05 kuni 2,50)	25 vähem / 1,000 (38 vähem kuni 60 rohkem)	⊕⊕OO Madal	
-----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	-------	---------------------	--------	----------------	----------------	--	---	---------------	--

Kirurgiline mask vs maskita, tervishoiutöötajad, kinnitatud H1N1, SARS, COVID-19

12 ^{8,9,33,34,35}	jälgimisuurungud	suur ^e	väike ^m	väike	väike	tugev seos	117/826 (14.2%)	234/1134 (20.6%)	šansside suhe (OR) 0,37 (0,20 kuni 0,66)	119 vähem / 1,000 (157 vähem kuni 60 vähem)	⊕⊕OO Madal	
----------------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------	-------	------------	-----------------	------------------	--	---	---------------	--

Kirurgilise maski kasutus vs ilma maskita, tervishoiutöötajad, SARS (nii kliiniline diagnoos kui ka laboratoorselt kinnitatud)

5 ^{23,36,37,38,39}	jälgimisuurungud	suur ⁿ	suur ^o	väike	suur ^p	väga tugev seos	56/326 (17.2%)	45/179 (25.1%)	šansside suhe (OR) 0,13 (0,03 kuni 0,62)	210 vähem / 1,000 (241 vähem kuni 79 vähem)	⊕OOO Väga madal	
-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	--	--	--------------------	--

Kitlid + kindad vs kindad, VRE kolonisatsioon/nosokomiaalsed infektsioonid

¹⁴⁰	jälgimisuurud	väike ^a	väike	väike	suur ^r	puudub	Uuring viidi läbi IROs, kaasati järjestikku osakonda hospitaliseeritud 181 patsienti. 8 voodi jurees kasutati vaid kindaid, 8 juures nii kindaid kui ka kitlit. Vaid kinnaste kasutuse grupis oli 88 patsienti, kinnaste ja kitli grupis 93 patsienti. 24 (25,8%) patsientides kinaste ja kitlike grupis ja 21 (23,9%) vaid kinaste grupis olnud patsientidest koloniseerused VRÉga. Keskmise aeg, mille joooks patsientid koloniseeritud olid 8,0 päeva kinnaste ja kitli grupis ja 7,1 päeva vaid kinnaste grupis. Nosokomiaalsete infektsioonide esinemine oli kinnaste ja kitli grupis 16 juhtu (17,2%) ja vaid kinnaste grupis 10 juhtu (10,2%). Ükski võrdlustest ei olnud statistiliselt oluline. VRÉga koloniseerumise riskifaktoriteks oli pigem IROs viibimise aeg, enteraalne toitmine ja sukrafaadi kasutus.	⊕○○○ Väga madal	
----------------	---------------	--------------------	-------	-------	-------------------	--------	--	--------------------	--

Kindad + kitlid pidevalt vs teadaoleva resistente bakteri kolonisatsiooni puhul, tervishoiutekkene infektsioon

¹⁴¹	randomiseeritud uuringud	suur ^s	väike	suur ^t	suur ^b	puudub	Võrreldi VAP, CLABS, CLAUTI esinemise erinevust võrreldes baastasemega. Uuringugruppidesse vahel ei esinenud antud infektsioonide osas esinemissageduse erinevust. Erinevused sekkumis- ja kontrollgruppi vahel: VAP -0,25 (95% CI -1,44-0,93), CLABS -0,32 (95% CI -0,61-0,96), CLAUTI -0,96 (95% CI -2,13-0,22).	⊕○○○ Väga madal	
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------------------	-------------------	--------	--	--------------------	--

Kindad + kitlid pidevalt vs teadaoleva resistente bakteri kolonisatsiooni puhul, MRSA kolonisatsioon

¹⁴¹	randomiseeritud uuringud	suur ^s	väike	suur ^t	väike	puudub	MRSA kolonisatsioon vähenes inteventsiionigrupis 10,03 kolonisatsioonilt 1000 patsiendipäeva kohta (95% CI, 8,05 - 12,50) algperioodil 6,00 kolonisatsioonile 1000 patsiendipäeva kohta (95% CI, 4,63 - 7,78). Kontrollosakondades vähenes MRSA kandlus 6,98 kolonisatsioonilt 1000 patsiendipäeva kohta (95% CI, 4,50 - 10,83) algperioodil 5,94 kolonisatsioonile 1000 patsiendipäeva kohta (95% CI, 4,59 - 7,67). Erinevus muutuses oli statsitiliselt oluline (erinevus, -2,98 kolonisatsiooni 1000 patsiendipäeva kohta; 95% CI, -5,58 kuni -0,38; P = 0,046).	⊕⊕○○ Madal	
----------------	--------------------------	-------------------	-------	-------------------	-------	--------	---	---------------	--

Kaitsekittel vs mitte, tervishoiutöötajad, kinnitatud SARS

5 ^{8,17,20,21,22,23}	jälgimisuurud	suur ^e	väike	väike	väike	tugev seos	175/1154 (15.2%)	131/329 (39.8%)	šansside suhe (OR) 0,24 (0,16 kuni 0,34)	261 vähem / 1,000 (302 vähem kuni 215 vähem)	⊕⊕○○ Madal	
-------------------------------	---------------	-------------------	-------	-------	-------	------------	------------------	-----------------	--	--	---------------	--

Kaitsekittel vs mitte, tervishoiutöötajad, kinnitatud H1N1, SARS, COVID-19 kokku

8 ^{8,10,12,17,19,20,21,22,23}	jälgimisuurud	suur ^e	väike	väike	väike	tugev seos	369/1843 (20.0%)	369/1205 (30.6%)	šansside suhe (OR) 0,46 (0,25 kuni 0,85)	137 vähem / 1,000 (207 vähem kuni 33 vähem)	⊕⊕○○ Madal	
--	---------------	-------------------	-------	-------	-------	------------	------------------	------------------	--	---	---------------	--

N95 respiraatori kasutus vs ilma maskita/kirurgiline mask, kinnitatud SARS/MERS, tervishoiutöötajad, aerosoole genereerivad protseduurid

^{2^{18,42}}	jälgimisuurud	suur ^e	väike	väike	suur ^{c,p}	puudub	Caputo jt kohortuuringus uuriti isikukaitsevahendite möju SARS-i nakatumisele intubatsioonil. N95 respiraatori kandnud tervhoidjatöötajatest nakatus 2/29-st töötajast, sellele lisanduvalt N95 maskiga võrdset teist maski kandnud töötajatest ei nakatumud keegi (0/5). Kirurgilist maski kandnud töötajaid oli 2, neist nakatus 1. Alraddadi jt kohortuuringus vaadeldi tervhoidjatöötajate MERS-i nakatumist aerosoole genereerivatel protseduuridel. N95 maski kandnutest nakatus 5 töötajat 90-st (5,6%), mittekandnutest 9 töötajat 73-st (12,3%). 95% töötajatest, kes N95 maski ei kandnud kandsid alati või vahel kirurgilist maski. Erinevus ei olnud statistiliselt oluline, RR 0,45 CI 0,16-1,29.	⊕○○○ Väga madal	
------------------------------	---------------	-------------------	-------	-------	---------------------	--------	--	--------------------	--

Sihtotstarbeline N95 respiraator vs pidev kriurgiline mask, tervishoiutöötajad, kliiniline respiratoorne viirushagus

^{1⁴³}	randomiseeritud uuringud	väike	väike	suur ^u	suur ^{b,v}	puudub	Võrreldi N95 respiraatori kasutamist kõrge risikiga protseduuridel ja pidevat maski kandmist. Kahe gruppi vahel ei esinenud statistiliselt olulist erinevust kliinilisse respiratoorsesse viirusesse nakatumises (N95 respiraator 98/572 vs kirurgiline mask 61/516, p=0,280).	⊕⊕○○ Madal	
---------------------------	--------------------------	-------	-------	-------------------	---------------------	--------	--	---------------	--

Kirurgiline mask vs N95 respiraator, laboratooselt kinnitatud respiratoorne viirus, tervishoiutöötajad

4 ^{25,43,44,45,46}	randomiseeritud uuringud	väike	väike	väga suur ^w	suur ^b	puudub	N95 respiraatori (n=4499) ja kirurgilise maski (n=3722) võrdluses ei leitud statistiliselt olulist erinevust (RR 1,05 CI 0,79 - 1,40)	⊕○○○ Väga madal	
-----------------------------	--------------------------	-------	-------	------------------------	-------------------	--------	---	--------------------	--

N95 respiraator vs maskita või kirurgiline mask, tervishoiutöötajad, kinnitatud COVID-19, MERS, H1N1, SARS

15 ^{8,11,15,16,17,18,24,42,47,48,49,50}	jälgimisuurud	suur ^e	väike	suur ^u	suur ^x	tugev seos	133/3402 (3.9%)	379/5776 (6.6%)	šansside suhe (OR) 0,32 (0,19 kuni 0,52)	44 vähem / 1,000 (52 vähem kuni 30 vähem)	⊕○○○ Väga madal	
--	---------------	-------------------	-------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	-----------------	--	--	--------------------	--

Visiir/kaitseprillid vs mitte, tervishoiutöötajad, kinnitatud H1N1, SARS, COVID-19

11 8,12,17,18,19,20,21,24,42,50,51,52	jälgimisuurused	suur ^e	väike	suur ^u	väike	tugev seos	280/2408 (11.6%)	538/2708 (19.9%)	šansside suhe (OR) 0.41 (0.27 kuni 0.62)	106 vähem / 1,000 (136 vähem kuni 65 vähem)	 Väga madal	
---------------------------------------	-----------------	-------------------	-------	-------------------	-------	------------	------------------	------------------	--	---	---	--

Silmade/não kaitse vs ilma, kinnitatud SARS/MERS, tervishoiutöötajad, aerosole genereerivad protseduurid

2 ^{18,42}	jälgimisuurused	suur ^e	väike	väike	suur ^{c,p}	puudub	Caputo jt kohortuuringus uuriti isikukaitsevahendite mõju SARSi nakatumisele intubatsioonil. Kaitseprillide kandnutest nakatus 1 töötaja 30-st, mittekandnutest 2/6-st. Visiiri kandnutest nakatus 1/14-st, mittekandnutest 2/22-st. Alraddadi jt kohortuuringus vaadeldi terivshoiutöötajate MERSi nakatumist aerosole genereerivatel protseduuridel. Silmade kaitset kandnud töötajatest nakatus 3/62-st (4.8%), mittekandnutest 11/100-st (11%). Erinevus ei olnud statistiliselt oluline, RR 0,44, CI 0,13-1,51.	 Väga madal	
--------------------	-----------------	-------------------	-------	-------	---------------------	--------	--	--	--

CI: usaldusintervall; **OR:** šansimääär; **RR:** riskimääär

Selgitused

- a. Morgan jt uuringus võis andmete esitamise nihkeriski tõosta ühe ja sama tervishoiutöötaja või patsiendi palati korduv vaatlemine; samuti ei olnud uuringus patsiendite algseid andmeid koloniseeritud piirkondade ja tüvede kohta - ei olnud võimalik teha selgeks, kas tervishoiutöötajal esinenud tävi ühtis patsiendi tüvega; samuti võis A.baumanii detekteerimiseks olnud meetod olla vähetundlik. Tenorio jt uuringus ei olnud võimalik eristada, kas VRE esines kindla sise- või välispinnal.
- b. Lai usaldusvahemik
- c. Usaldusvahemikke pole kõigil tulemustel
- d. Kontrolligruppi kinnaste kasutus oli oodatust suurem - võimalik mõju osakondade vahelisel personali infovahetusel või sel ajal AIDSi teadlikkuse tõus.
- e. Hinnati paljude erinevate kaitsevahendite kasutust korraga, hinnatud mõju võis mõjutada samal ajal muu kaitsevarustuse kasutamine.
- f. Cowling 2008 uuringus oli kõrge väljalangemisprotsent (32% kontrollrühmas, 37.5% kätehügieenirühmas, 39.4% näomaskide ja kätehügieeni rühmas), randomiseerimisjärjestuse muutmine, seletamatud väljalangemised, ebausaldusväärseks osutunud kiirtesti kasutamine g. 12=1%
- h. Uuringud viidud läbi nii tervishoiutöötajate seas kui ka tavapopulatsiooni
- i. Uuringud ei olnud piimendatud. Jacobs jt 2009 a uuringus oli intervencionirühmas (mask) gripi vastu vaksineeritud 100% osalejatest, kontrollrühmas vaid 81%.
- j. Nihkeriski tõstab sümpotmiste iseraporteerimine, gripp ei olnud laboratoorselt kinnitatud.
- k. 12=0%
- l. Jacobs jt uuring väga väikesed valimiga - <100 tervishoiutöötaja
- m. I2 oli küll 72%, kuid usaldusintervallidel oli suur kattuvus.
- n. Enamikes uuringutes oli isikukaitsevahendite kasutus ise raporteeritud. Seto 2003 uuringus oli 15% väljalangevus. Yin jt täistekst hiina keeles - puudub täpne info kontrollrühma/sekkumisrühma ja tulemusnäitajate osas.
- o. I2=68%
- p. Väike valim
- q. Sekkumisgruppide ruumid olid erinevad (kinnaste gruppis 4 tuba 2-kohalised, kindad+kitlid gruppid 1-kohalised), samas ei olnud kahekohalistes tubades vähenene VREga saastumise tõus statistiliselt oluline
- r. Ei ole toodud täpselt välja uuringugruppide võrdlusi, mainitud vaid, et võdilised ei olnud statistiliselt olulised ja kõigi puhul oli p>0,05
- s. Uuringugruppe ei olnud võimalik sekümisse osas piimendada, sekkumisgruppis vähenes patsiendi külalustute arv ja suurennes kätehügieeni teostamise sagedus palatist väljumisel
- t. Hinnati kinnaste ja kitlike, mitte vaid kitli kandmise mõju
- u. Hinnati üldist isikukaitsevahendite mõju, mitte spetsiaalfiliselt AGP-del.
- v. Ei olnud kirjeldatud, mida kasutusid sihtotstarbelise N95 respiraatori rühmas olnud osalejad muiul ajal (kirurgiline mask, ilma maskita?)
- w. Hinnati pidavat maski vs pidavat respiraatori kandmist, mitte nende erinevust aerosole genereerivatel protseduuridel.
- x. Võrdlusgrupp oli heterogeenne - nii kirurgiliste maskide kandmine kui ka ilma maskita

Viited

- Picheansanthian W, Chotibang J. Glove utilization in the prevention of cross transmission: a systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep; 2015 May 15.
- Hayden M, Blom D, Lytle E, Moore C, Weinstein R. Risk of Hand or Glove Contamination After Contact With Patients Colonized With Vancomycin-Resistant Enterococcus or the Colonized Patients' Environment. Infection Control and Hospital Epidemiology; 2008.
- Pesso-Silva CL, Dharam S, Hugonet S, Touveneau S, Postay-Barbe K, Pfister R, Pittet D. Dynamics of bacterial hand contamination during routine neonatal care. Infect Control Hosp Epidemiol; 2004.
- Morgan DJ, Liang SY, Smith CL, Johnson JK, Harris AD, Furuno JP, Thom KA, Snyder GM, Day HR, Perencevich EN. Frequent multidrug-resistant Acinetobacter baumannii contamination of gloves, gowns, and hands of healthcare workers. Infect Control Hosp Epidemiol; 2010.
- Tenorio AR, Badri SM, Sahgal NB, Hota B, Matushek M, Hayden MK, Trenholme GM, Weinstein RA. Effectiveness of gloves in the prevention of hand carriage of vancomycin-resistant enterococcus species by health care workers after patient care. Clin Infect Dis; 2001.
- Hsu J, Abad C, Dinh M, Saifdar N. Prevention of endemic healthcare-associated Clostridium difficile infection: reviewing the evidence. Am J Gastroenterol; 2010 Nov.
- Johnson S, Gerdin DN, Olson MM, Weller MD, Hughes RA, Clabots CR, Peterson LR. Prospective, controlled study of vinyl glove use to interrupt Clostridium difficile nosocomial transmission. Am J Med; 1990 Feb.
- Yan C, Lovins O, Valsmann A, Chin KJ, Iomlinson G, Lee Y, Englesakis M, Parotto M, Singh M.. Risk factors and protective measures for healthcare worker infection during highly infectious viral respiratory epidemics: a systematic review and meta-analysis. Infect Control Hosp Epidemiol; 2021.
- Jaeger JL, Patel M, Dharam N, Hancock K, Meites E, Mattson C, Gladden M, Sugerman D, Doshi S, Blau D, Harriman K, Whaley M, Sun H, Ginsberg M, Kao AS, Kriner P, Lindstrom S, Jain S, Katz J, Finelli L, Olsen SJ, Kallen AJ. Transmission of 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus among healthcare personnel-Southern California, 2009. . Infect Control Hosp Epidemiol; 2011.
- Barrett ES, Horton DB, Roy J, Gennaro ML, Brooks A, Tischfield J, Greenberg P, Andrews T, Jagpal S, Reilly N, Blaser MJ, Carson JL, Panettieri RA Jr. Prevalence of SARS-CoV-2 infection in previously undiagnosed health care workers at the onset of the U.S. COVID-19 epidemic. BMC Infect Dis; 2020.
- Chokephaibulkit K, Assanasen S, Apisarnthanarak A, Rongrusnguan Y, Kachintorn K, Tuntiwattanapibul Y, Judaeng T, Puthavathana P. Seroprevalence of 2009 H1N1 virus infection and self-reported infection control practices among healthcare professionals following the first outbreak in Bangkok, Thailand. Influenza Other Respir Viruses; 2013.
- Chatterjee P, Anand T, Singh KJ, Rasaily R, Singh R, Das S, Singh H, Praharaj I, Gangakhedkar RR, Bhargava B, Pandya S. Healthcare workers & SARS-CoV-2 infection in India: A case-control investigation in the time of COVID-19. Indian J Med Res ; 2020.
- Heinzerling A, Stuckey J, Schaefer T, Xu K, Perkins KM, Resseger HG, Magill S, Verani JR, Jain S, Acosta M, Epstein E. Transmission of COVID-19 to Health Care Personnel During Exposures to a Hospitalized Patient - Solano County, California, February 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep; 2020.
- Marshall C, Kelso A, McBryde E, Barr IG, Eisen DP, Sasadeusz J, Buisling K, Cheng AC, Johnson P, Richards M. Pandemic (H1N1) 2009 risk for frontline health care workers. Emerg Infect Dis; 2011.
- Wilder-Smith A, Teleshman MD, Heng BH, Ernest A, Ling AE, Leo YS. Asymptomatic SARS coronavirus infection among healthcare workers, Singapore. Emerg Infect Dis; 2005.
- Zhang Y, Seale H, Yang P, MacIntyre CR, Blackwell B, Tang S, Wang Q. Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China. 7; 2013.
- Lau JI, Fung J, Wong TW, Kim JH, Wong E, Chung S, Ho D, Chan LY, Liu SF, Cheng A. SARS transmission among hospital workers in Hong Kong. Emerg Infect Dis; 2004.
- Caputo KM, Byrck R, Chapman MG, Orser BJ, Orser BA. Intubation of SARS patients: infection and perspectives of healthcare workers. Can J Anaesth; 2006 Feb.
- Toyokawa T, Sunagawa T, Yahata Y, Ohyama T, Kodama T, Satoh H, Ueno-Yamamoto K, Arai S, Araki K, Odaira F, Tsuichihi Y, Takahashi H, Tanaka-Taya K, Okabe N. Seroprevalence of antibodies to pandemic (H1N1) 2009 influenza virus among health care workers in two general hospitals after first outbreak in Kobe, Japan. J Infect; 2011.
- Pei LY, Gao ZC, Yang Z, Wei DG, Wang SX, Ji JM, Jiang BG. Investigation of the influencing factors on severe acute respiratory syndrome among health care workers. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban; 2006.
- Raboud J, Shigayeva A, McGeer A, Bontovics E, Chapman M, Gravel D, Henry B, Lapinsky S, Loeb M, McDonald LC, Ofner M, Paton S, Reynolds D, Scales D, Shen S, Simor A, Stewart T, Vearncombe M, Zoutman D, Green K. Risk factors for SARS transmission from patients requiring intubation: a multicentre investigation in Toronto, Canada. PLoS One; 2010.
- Teleshman MD, Boudville IC, Heng BH, Zhu D, Leo YS. Factors associated with transmission of severe acute respiratory syndrome among health-care workers in Singapore. Epidemiol Infect; 2004.
- Nishiura H, Kuratsuji T, Ouy T, Phi NC, Van Ban V, Ha LE, Long HT, Yanai H, Keicho N, Kirikae T, Sasazuki T, Anderson RM. Rapid awareness and transmission of severe acute respiratory syndrome in Hanoi French Hospital, Vietnam. Am J Trop Med Hyg; 2005.
- Liu W, Tang F, Fang L, Guo D, Yu L, Diao Y, Zhou J, PLoaman C, Richardus J, H, and Cao W-C. Risk factors for SARS infection among hospital healthcare workers in Beijing: a case control study. Tropical Medicine & International Health; 2009.
- Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, Ferroni E, Al-Ansary LA, Bawazeer GA, van Driel ML, Jones MA, Thorning S, Bellier EM, Clark J, Hoffmann TC, Glasziou PP, Conly JM. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2020.
- MacIntyre CR, Seal H, Dung TC, Hien NT, Ngai PT, Chughtai AA, et al. A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ Open; 2015.
- Suess C, Remschmidt C, Schink SB, Schweiger B, Nitsche A, Schroeder K, et al. The role of facemasks and hand hygiene in the prevention of influenza transmission in households: results from a cluster randomised trial. BMC Infectious Disease; 2012.
- MacIntyre CR, Zhang Y, Chughtai AA, Seale H, Zhang D, Chu Y, Zhang H, Rahman B, Wang Q. Cluster randomised controlled trial to examine medical mask use as source control for people with respiratory illness. BMJ Open; 2016.
- MacIntyre CR, Kirk DK, Cauchemez S, Dwyer DE, Seale H, Cheung P, Brownie G, Fasheh M, Wood J, Gao Z, Booy R, Ferguson NM. Face mask use and control of respiratory virus transmission in households. Emerg Infect Dis; 2009.
- Cowling BJ, Funk RO, Cheng CK, Fang VJ, Chan KH, Seto WH, Yung R, Chiu B, Lee P, Uyeki TM, Houck PM, Peiris JS, Leung GM. Preliminary findings of a randomized trial of non-pharmaceutical interventions to prevent influenza transmission in households. PLoS One; 2008.
- Aliello AE, Perez V, Coulborn RM, Davis BM, Uddin M, Monto AS. Facemasks, hand hygiene, and influenza among young adults: a randomized intervention trial. PLoS One; 2012.
- Jacobs JL, Ohde S, Takahashi O, Tokuda Y, Omata F, Fukui T. Use of surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among health care workers in Japan: a randomized controlled trial. American Journal of Infection Control; 2009.

- 33.Sandoval C, Barrera A,Ferrés M,Cerda J,Retamal J,García-Sastre A,Medina RA,Hirsch T. Infection in Health Personnel with High and Low Levels of Exposure in a Hospital Setting during the H1N1 2009 Influenza A Pandemic. *PLoS One*; 2016.
- 34.Nishiyama A, Wakanugi N,Kirikae T,Quy T,Ha le D,Ban VV,Long HT,Keicho N,Sasazuki T,Kuratsujii T. Risk factors for SARS infection within hospitals in Hanoi, Vietnam. *Jpn J Infect Dis*; 2008.
- 35.Reynolds MG, Anh BH,Thu VH,Montgomery JM,Bausch DG,Shah JJ,Maloney S,Leitmeyer KC,Huy VQ,Horby P,Plant AY,Uyeki TM. Factors associated with nosocomial SARS-CoV transmission among healthcare workers in Hanoi, Vietnam, 2003. *BMC Public Health*; 2006.
- 36.Offeddu V, Yung CF,Low MSF,Tam CC. Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clin Infect Dis*; 2017 Nov 13.
- 37.Seto WH, Tsang D,Yung RW,Ching TY,Ng TK,Ho M,Ho LM,Pearis JS,Advisors of Expert SARS group of Hospital Authority. Effectiveness of precautions against droplets and contact in prevention of nosocomial transmission of severe acute respiratory syndrome (SARS). *Lancet*; 2003.
- 38.Loeb M, McGeer A, Henry B,Ofner M,Rose D,Hlywka T,Levie J,McQueen J,Smith S,Moss L,Smith A,Green K,Walter SD. SARS among critical care nurses, Toronto. *Emerg Infect Dis*. 2004.
- 39.Yin WW,Gao LD,Lin WS,Gao LD,Lin WS,Du L,Zhang XC,Zou Q,Li LH,Liang W,Peng GW,He JF,Yu DW,Zhou DH,Lin JY,Zeng G. Effectiveness of personal protective measures in prevention of nosocomial transmission of severe acute respiratory syndrome. *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi*; 2004.
- 40.Slaughter S, Hayden MK,Nathan C,Hu TC,Rice T,Van Voorhis J,Matushek M,Franklin C,Weinstein RA. A comparison of the effect of universal use of gloves and gowns with that of glove use alone on acquisition of vancomycin-resistant enterococci in a medical intensive care unit. *Ann Intern Med*; 1996 Sep 15.
- 41.Harris AD,Pineles L,Belton B,Johnson JK,Shardell M,Loeb M,Newhouse R,Dembry L,Braun B,Perencevich EN,Hall KK,Morgan DJ, Benefits of Universal Glove and Gown (BUGG) Investigators, Shahryar SK,Price CS,Gadbaaw JJ,Drees M,Kett DH,Muñoz-Price LS,Jacob JT,Herwaldt LA,Sulis CA,Yokoe DS,Maragakis L,Lissauer ME,Zervos MJ,Warrén DK,Carver RL,Anderson DJ,Calfee DP,Bowling JE,Safdar N. Universal glove and gown use and acquisition of antibiotic-resistant bacteria in the ICU: a randomized trial. *JAMA*; 2013 Oct 16.
- 42.Alraddadi BM, Al-Salmi HS,Jacobs-Slifka K,Slayton RB,Estivariz CF,Geller AI,Al-Turkistani HH,Al-Rehily SS,Alserehi HA,Wali GY,Alshukairi AN,Azhar El,Haynes L,Swerdlow DL,Jernigan JA,Madani TA. Risk Factors for Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Infection among Healthcare Personnel. *Emerg Infect Dis*; 2016 Nov.
- 43.MacIntyre CR,Wang Q,Seale H,Yang P,Shi W,Gao Z,Rahman B,Zhang Y,Wang X,Newall AT,Heywood A,Dwyer DE. A randomized clinical trial of three options for N95 respirators and medical masks in health workers. *Am J Respir Crit Care Med*; 2013.
- 44.MacIntyre CR,Wang Q,Cauhemez S,Seale H,Dwyer DE,Yang P,Shi W,Gao Z,Pang X,Zhang Y,Wang X,Duan W,Rahman B,Ferguson NM. A cluster randomized clinical trial comparing fit-tested and non-fit-tested N95 respirators to medical masks to prevent respiratory virus infection in health care workers. *Influenza Other Respir Viruses*; 2011.
- 45.Loeb M,Dafee N,Mahony J,John M,Sarabia A,Glavin V,Webby R,Smeja M,Earn DJ,Chong S,Webb A,Walter SD. Surgical mask vs N95 respirator for preventing influenza among health care workers: a randomized trial. *JAMA*; 2009.
- 46.Radonovich LJ Jr, Simberloff MS,Besselsen MT,Brown AC,Cummings DAT,Gaydos CA et al ResPECT Investigators. N95 respirators vs medical masks for preventing influenza among health care personnel: a randomized clinical trial. *JAMA*; 2019.
- 47.Guo X,Wang J,Hu D,Wu L,Gu L,Wang Y,Zhao J,Zeng L,Zhang J,Wu Y. Survey of COVID-19 Disease Among Orthopaedic Surgeons in Wuhan, People's Republic of China. *J Bone Joint Surg Am*; 2020 May 20;102(10).
- 48.Wang X,Pan Z,Cheng Z. Association between 2019-nCoV transmission and N95 respirator use. *J Hosp Infect*; 2020.
- 49.Qiangping Wang,Xing Huang,Yansen Bai,Xuan Wang,Haifun Wang,Xuebin Hu,Feng Wang,Xianke Wang,Jincao Chen,Qianxue Chen,Xiaobing Jiang,Hongyang Zhao medRxiv. Epidemiological characteristics of COVID-19 in medical staff members of neurosurgery departments in Hubei province: A multicentre descriptive study. 2020.
- 50.Kim CJ, Choi WS,Jung Y,Kiem S,Seol HY,Woo HJ,Choi YH,Son JS,Kim KH,Kim YS,Kim ES,Park SH,Yoon JH,Choi SM,Lee H,Oh WS,Choi SY,Kim NJ,Choi JP,Park SY,Kim J,Jeong SJ,Lee KS,Jang HC,Rhee JY,Kim BN,Bang JH,Lee JH,Park S,Kim HY,Choi JK,W YM,Choi HJ. Surveillance of the Middle East respiratory syndrome (MERS) coronavirus (CoV) infection in healthcare workers after contact with confirmed MERS patients: incidence and risk factors of MERS-CoV seropositivity. *Clin Microbiol Infect*; 2016.
- 51.Kuster SP,Coleman BL,Raboud J,McNeil S,De Serres G,Gubbay Hatchette T,Katz KC,Loeb M,Low D,Mazzulli T,Simor A,McGeer AJ, Group, Working,Adult,Influenza,Cohort,Study. Risk factors for influenza among health care workers during 2009 pandemic, Toronto, Ontario, Canada. *Emerg Infect Dis*; 2013.
- 52.Chen WQ,Ling WM,Lu CY,Hao YT,Lin ZN,Ling L,Huang J,Li G,Yan GM. Which preventive measures might protect health care workers from SARS?. *BMC Public Health*; 2009.