

LISA 2

Tabel 7. PEP-iga alustamine ja ravi jälgimine¹⁷

Test	Potent- siaalselt nakkust edasi kandnud isik	Isik, kellel esineb HIV-i nakatumise risk			
	Kokku- puute- järgselt	Kokku- puute- järgselt	4–6 nädalat pärast kokku- puudet	3 kuud pärast kokku- puudet	6 kuud pärast kokku- puudet
Kõikide kokkupuudetüüpide korral					
S-HIV1,2 Ag + Ab ^a	✓	✓	✓	✓	✓ ^b
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen (HBsAg); B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade hulk (HBsAb); B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad (HBcAb)	✓	✓	–	–	✓ ^c
C-hepatiidi viiruse vastased antikehad (HCV Ab)	✓	✓	–	–	✓ ^d
Seksuaalse kokkupuute järgselt					
<i>Treponema pallidum</i> vastased antikehad (<i>T.</i> <i>pallidum</i> Ab) ^e	✓	✓	✓	–	✓
<i>N. gonorrhoeae</i> DNA ^f	✓	✓	✓ ^g	–	–
<i>C. trachomatis</i> DNA ^f	✓	✓	✓ ^g	–	–
hCG verest	–	✓ ^h	✓ ^h	–	–

¹⁷ Tabel kohandatud: Centers for Disease Control and Prevention & US Department of Health and Human Services. Updated guidelines for antiretroviral postexposure prophylaxis after sexual, injection drug use, or other nonoccupational exposure to HIV – United States, 2016. CDC & DHHS; 2016.

Isikutel, kes alustasid PEP-iga					
Kreatiini seerumis/plasmas, hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (eGFR)		✓	✓	–	–
Alaniini aminotransferaas (ALAT), Aspartaadi aminotransferaas (ASAT)		✓	✓	–	–
Kõigil isikutel, kellel diagnoositi ükskõik millisel vastuvõtul HIV					
HIV-i viiruskoopiate arv (HIV RNA)	✓		✓		
HIV-i resistentsuse määramine	✓		✓ ⁱ		

- ^a positiivne tulemus vajab alati kinnitavat uuringut
- ^b ainult kui esmase ekspositsiooni käigus nakatuti C-hepatiiti
- ^c kui eksponeeritud inimene oli kokkupuutejärgselt vastuvõtlik B-hepatiidile
- ^d kui eksponeeritud inimene oli kokkupuutejärgselt vastuvõtlik C-hepatiidile
- ^e kui süüfilis diagnoositi ja alustati ravi, peaks kuus kuud pärast ravi uuesti testima
- ^f kui gonorröa või klamüdioos diagnoositi, peaks kolm kuud pärast ravi uuesti testima
- ^g kui pärast kokkupuudet ei alustatud ennetavat ravi või järelkontrollis esinevad kaebused
- ^h reproduktiivses eas naine, ei kasutatud efektiivset rasestumisvastast vahendit ja oli vaginaalne kokkupuude
- ⁱ ravi ebaõnnestumise korral