

Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu käsitusjuhend

TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 17

Kuupäev	19.-21. september 2016
Koht	Elektrooniline koosolek
Osalejad	Töörühma liikmed: Pille Andresson, Pille Vaas, Tuuli Metsvaht, Ena Volmer, Birgit Suits, Aune Siller, Kadi Ploom, Svetlana Mürsepp, Liis Toome, Heili Varendi, Jana Klementsov, Pille Teesalu, Vivian Arusaar, Triinu Kalle Täiendavalt osalesid: Anna Vesper
Puuduvad töörühma liikmed	
Juhatas	Pille Andresson
Protokollis	Anna Vesper
Päevakord	1. Muudetud soovitude kinnitamine. 2. Ravijuhendi ja rakenduskava kinnitamine.
Ülevaade toimunud aruteludest	<p>1. Muudetud soovitude kinnitamine.</p> <p>Ravijuhendi töörühma liikmed on vastavalt saadud tagasisidele täpsustanud ravijuhendi soovitude sõnastusi ning nõus soovitude sõnastuste täpsustustega.</p> <p>Eraldi arutleti soovitus 5 ümbersõnastamist, mis tagasiside põhjal oli mõistetamatu ja polnud juurutatav. Toimus pikk arutelu, lõplik soovitus sõnastus järgmine:</p> <p><i>Soovitus 5.</i> Ähvardava enneaegse sünnituse korral eelistage üsasisest transporti järgnevalt:</p> <ul style="list-style-type: none">- 34+⁰ kuni 36+⁶ GN – kui haiglas puudub lastearsti ööpäevaringne valve, vastav aparatuur ja pädev personal enneaegse vastsündinu abistamiseks, transportida patsient keskhaiglasse või piirkondliku tasemega haiglasse;- vähem kui 33+⁶ GN kestnud raseduse korral üldhaiglatest ja maakondade keskhaiglatest (v.a Tallinn) transportida patsient piirkondliku tasemega haiglasse;- vähem kui 30+⁰ GN kestnud raseduse korral Tallinnas transportida patsient piirkondliku tasemega haiglasse. → hea tava suunis <p>Lisaks vaadati üle soovitus 52 tõendusmaterjal ning töörühma arutelu tulemusena otsustati täpsustada soovitus sõnastust ning alandada soovitus tugevust. Viited (Saugstad & Aune 2014; Manja ja Cook 2015). Vt EvSu_K16).</p> <p><i>Soovitus 52.</i> Enne 32+0 GN-i sündinud enneaegsel vastsündinul hapnikravi kasutamisel soovitame hoida SpO₂ väärtused 90–95% kuni postmenstruaalvanuseni 36 nädalat. → soovitus pigem teha</p> <p>Töörühma arutelu tulemusena eemaldatakse ravijuhendist soovitus, mis mille sisu on käsitletud juba surfaktantravi küsimuse juures. Eemaldatud soovitus 95. Mitteinvasiivsel hingamistoetusel olevale</p>

	<p>enneaegsele vastsündinule soovitame PDA ennetamiseks varast surfaktantravi.</p> <p>Töörühma liikmed on nõus soovituse 52 tugevuse alandamisega ning soovituse 95 eemaldamisega.</p> <p>2. Ravijuhendi ja rakenduskava kinnitamine Kõik töörühma liikmed on tutvunud ravijuhendisse ja rakenduskavasse sisse viidud muudatustega. Muudatused/täiendused on tehtud vastavalt laekunud tagasisidele ja töörühma poolt tehtud otsustele vastuste osas (vt protokoll 16).</p> <p>Kõik töörühma liikmed on nõus ravijuhendis ja rakenduskavas tehtud muudatustega, mõlemad dokumendid kinnitatakse. Ravijuhend koos rakenduskava ja muude asjakohaste materjalidega esitatakse Ravijuhendite nõukojale.</p>
Vastuvõetud otsused	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soovituste sõnastuse täpsustused, soovituse 5 ümbersõnastamine, soovituse 52 tugevuse alandamine ja soovituse 95 eemaldamise ravijuhendist töörühma liikmete poolt kinnitatud. 2. Ravijuhend ja rakenduskava on kõigi töörühma liikmete poolt kinnitatud. 3. 21.09.2016 esitatakse ravijuhend koos rakenduskava ja muude asjakohaste dokumentidega Ravijuhendite nõukojale.