

## Lisa 5. Tokolüütiliste ravimite kasutamine

### Kaltsiumikanali blokaator (nifedipiin)

	Manustamise viis	Annus	Intervall
Algannus	suu kaudu	20 mg	
Emaka kontraktsioonid püsivad	suu kaudu	20 mg + 20 mg	30 min tagant
Säilitusannus	suu kaudu	20 mg	6 tunni tagant 48 tunni jooksul
Maksimaalne annus ööpäevas	suu kaudu	160 mg	
Tähelepanu!	Kõrvaltoimete vältimiseks mitte kasutada kombinatsioonis teiste tokolüütiliste ravimitega		

### Heksoprenaliin

Annustamine		Manustamise viis	
Ravim	Lahus ja lahuse kogus	Tilkade arv minutis	ml/min (20 tilka = 1 ml)
25 mcg (1 x 5 ml ampull)	0,9% NaCl 500 ml või 5% Glyc 500 ml	120 tilk/min	6 ml/min
50 mcg (2 x 5 ml ampulli)	0,9% NaCl 500 ml või 5% Glyc 500 ml	60 tilk/min	3 ml/min
75 mcg (3 x 5 ml ampulli)	0,9% NaCl 500 ml või 5% Glyc 500 ml	40 tilk/min	2 ml/min
100 mcg (4 x 5 ml ampulli)	0,9% NaCl 500 ml või 5% Glyc 500 ml	30 tilk/min	1,5 ml/min
Tähelepanu!	Kõrvaltoimete vältimiseks mitte kasutada kombinatsioonis teiste tokolüütiliste ravimitega		

## Oksütotsiinireseptori antagonist (atosibaan)

	Manustamise viis	Annus	Intervall
<b>Algannus</b>	veenisisesi boolusena	6,75 mg 1 min jooksul	
<b>Säilitusannus</b>	veenisisesi püsiinfusioonina	18 mg/t	3 t jooksul
<b>Maksimaalne annus ööpäevas</b>	veenisisesi püsiinfusioonina	6 mg/t	45 t jooksul (maksimaalselt 330 mg)
<b>Tähelepanu!</b>	Kõrvaltoimete vältimiseks mitte kasutada kombinatsioonis teiste tokolüütiliste ravimitega		

## Tsüklooksügenaasi inhibiitorid (indometatsiin)

	Manustamise viis	Annus	Intervall
<b>Algannus</b>	suu kaudu	50 mg	
<b>Säilitusannus</b>	suu kaudu	25 mg	6 t tagant 48 t jooksul
<b>Tähelepanu!</b>	Tohib kasutada enne 28 <sup>+0</sup> GN-i. Kõrvaltoimete vältimiseks mitte kasutada kombinatsioonis teiste tokolüütiliste ravimitega		