

## **Empiirilise antibakteriaalse ravi annused (NEOFAX)**

**Penitsilliin G:** 25 000 – 50 000 TÜ/kg/dosi, veenisine infusioon 15 min jooksul (meningiidi korral kahekordista annust)

<b>Postmenstruaalvanus (nädalates)</b>	<b>Postnataalne vanus (päevades)</b>	<b>Doos (TÜ/kg/dosi)</b>	<b>Manustamise intervall (tundides)</b>
≤ 29	0–28	25 000–50 000	12
30–36	0–14	25 000–50 000	12
37–44	0–7	25 000–50 000	12
> 44	kõik	25 000–50 000	12

**Ampitsilliin:** 25–50 mg/kg/dosi, veenisisesi aeglaselt

<b>Postmenstruaalvanus (nädalates)</b>	<b>Postnataalne vanus (päevades)</b>	<b>Doos (mg/kg/dosi)</b>	<b>Manustamise intervall (tundides)</b>
≤ 29	0–28	25–50	12
30–36	0–14	25–50	12
37–44	0–7	25–50	12
> 44	kõik	25–50	12

**Gentamütsiin:** veenisine infusioon perfuusoriga 30 min jooksul

<b>Postmenstruaalvanus (nädalates)</b>	<b>Postnataalne vanus (päevades)</b>	<b>Doos (mg/kg/dosi)</b>	<b>Manustamise intervall (tundides)</b>
≤ 29	0–7	5	48
30–34	0–7	4,5	36
≥ 35	kõik	4	24