

### Lisa 13. Nahk naha kontakti alustamine enneagsetel vastsündinutel

<b>Gestatsioonivanus 32<sup>+0</sup> – 36<sup>+6</sup></b> nädalat	Lapse seisundi esmane hindamine sünnitustoaas ema rindkerel, NNK-d alustada kohe pärast seisundi esmast stabiliseerimist. CPAP-ravi rakendamisel: pärast stabilisatsiooni transport ema juurde kanguruhoolduseks koos monitori ja jälgimisega.
<b>Gestatsioonivanus 28<sup>+0</sup> – 31<sup>+6</sup></b> nädalat	NNK kohe pärast seisundi esmast hindamist/stabilisatsiooni, kui lapse seisund ja hooldus võimaldab.
<b>Gestatsioonivanus 22<sup>+0</sup> – 26<sup>+6</sup></b> nädalat	NNK esimesel elunädalal rajaneb individuaalsel meditsiinilisel hinnangul.
<b>Keisrilõige</b>	NNK lühiaegselt ema rindkerel operatsioonitoas, võimaluse korral jätkata operatsioonijärgsel jälgimisel. Kui ema on transporditud intensiivravi osakonda, teha nii palju NNK-d kui võimalik, rakendamata piiranguid, kui need ei ole põhjendatud (isa või asendaja).