

## Lisa 8. Trombemboolia ja veritsuse riskiskoorid – CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc skoor KVA-ga patsiendi trombemboolia riski hindamiseks

	Riskitegur	Skoor	Selgitus
C	Südamepuudulikkus	1	Parema, vasaku või mõlema vatsakese puudulikkuse sümptomid, mida kinnitavad südame düsfunktsiooni näitavad uuringute tulemused
H	Hüpertensioon	1	Arteriaalne vererõhk üle 140/90 mmHg vähemalt kahel mõõtmisel või antihüpertensiivne ravi
A <sub>2</sub>	Vanus ≥ 75 a	2	
D	Diabeet	1	Paastuglukoos üle 7 mmol/l või diabeediravi
S <sub>2</sub>	Ajuinfarkt, TIA, trombembol	2	
V	Vaskulaarhaigus	1	Varasem müokardiinfarkt, stenokardia, perkutaanne koronaarinterventsioon või aortokoronaarne šuntimine Klaudikatsioon, kõhuaordi või alajäsemearterite perkutaanne interventsioon või operatsioon, kõhu- või rindkereoperatsioon, arteri- või veenitromboos
A	Vanus 65...74 a	1	
Sc	Naissugu	1	