

Naatriumkarbinaadi infusiooni võrreldes mitte hüperfusioonist tingitud laktatsidoosi korral septilise või septilise šokiga patsientidel

Bibliograafia:

Tulemusnäitajad	№ osalejatest (studies) Follow-up	Tõendatusaste (GRADE)	Suhteline toime (95% CI)	Eeldatavad absoluutsed toimed	
				Risk koos mitte	Riski erinevus vs naatriumkarbinaadi infusiooni
28 päeva suremus	72 (1 jälgimisuuring) 1,a	⊕○○○ VÄGA MADAL ^b	-	-	-
Uus tulemusnäitaja	(uuringut)	-	mittehinnatav	0 / 1,000	0 vähem / 1,000 (0 vähem kuni 0 vähem)

***Sekumisrühma risk** (ja selle 95% usaldusintervall) põhineb oletataval võrdusrühma riskil ja sekkumise suhtelisel toimel (ja selle 95% CI-l).

CI: usaldusintervall; **RR:** riskimäär

GRADE tööühma tõendusmaterjali hinded

Kõrge kvaliteet: Oleme väga kindlad, et tegelik toime on väga sarnane hinnangulise toimega

Keskmine kvaliteet: Oleme keskmiselt kindlad toime hinnangus: tegelik toime on tõenäoliselt sarnane hinnangulise toimega, kuid on võimalik, et see on märkimisväärselt erinev

Madal kvaliteet: Meie kindlus toime hinnangus on piiratud: tegelik toime võib olla märkimisväärselt erinev hinnangulisest toimest

Väga madal kvaliteet: meil on väga väike kindlus hinnangulises toimes: tegelik toime on tõenäoliselt märkimisväärselt erinev hinnangulisest toimest

Selgitused

- NICE on defineerinud juhtkontrolluuringuna, kuid tegelikult on kohortuuring
- kohortuuring, uuritavate arv väike

Viited

- El-Solh, AA. et al. Bicarbonate therapy in the treatment of septic shock: a second look. Internal and Emergency Medicine; 2010.