

Lisa 1. Sepsise äratundmine

Süsteemne põletikureaktsioon*	
<input type="checkbox"/>	Kehatemperatuur >38,3 või <36 °C
<input type="checkbox"/>	Tahhükardia >90 löögi minutis
<input type="checkbox"/>	Tahhüpnöe >20 korra minutis või PaCO ₂ <32 mm Hg
<input type="checkbox"/>	Leukotsüütide arv >12 või <4 x10 ⁹ /l või üle 10% noori vorme (kepptomseid neutrofiile)

* Vähemalt kaks sümptomit neljast

Organpuudulikkus(ed)	
<input type="checkbox"/>	Teadushäire GKS <15
<input type="checkbox"/>	Hingamissagedus ≥22/min
<input type="checkbox"/>	Süstoolne vererõhk ≤100 mm Hg
<input type="checkbox"/>	Laktaat >2 mmol/l
<input type="checkbox"/>	Kreatiniin >171 µmol/l või oliguuria <500 ml päevas
<input type="checkbox"/>	Bilirubiin >33 µmol/l
<input type="checkbox"/>	Muu _____

Süsteemne põletikureaktsioon koos organpuudulikkusega vihjab sepsisele!

Infektsioonhaiguse anamnees, kaebused? Infektsiooni kolle ja tunnused?

Verekülvid ja empiiriline intravenoosne antimikroobne ravi!

Riskigrupid

- Vanus >75 a
- Immuunosupressioon - diabeet, kemoterapia, süsteemne kortikosteroidravi
- Viimase 6 nädala jooksul tehtud operatsioon või invasiivne protseduur
- Naha haavad, põletus
- Püsikateetrid või -liinid (nt kusepõie kateeter, tsentraalveeni kateeter, dialüüsi sond)
- Süstitavate narkootikumide tarvitamine