

## Lisa 2. Sepsise esmane diagnostika ja ravi

Esimene tund	<b>Üldseisundi esmane stabiliseerimine</b>	<b>Ravi eesmärgid</b>
	<input type="checkbox"/> EKG, vererõhu, SpO <sub>2</sub> ja diureesi monitooring	
	<input type="checkbox"/> Hapnikravi – O <sub>2</sub> -mask, mitteinvasiivne ventilatsioon, vajadusel intubatsioon, aparaadihingamine	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> ≥ 95%
	<input type="checkbox"/> Infusioonravi – isotooniline kristalloidlahus 500 ml boolusena, vajadusel korrata kuni oodatava efekti saavutamiseni	<input type="checkbox"/> Diurees ≥ 0,5 ml/kg/t <input type="checkbox"/> Laktaadi normaliseerumine
	<input type="checkbox"/> Vasopressoorne ravi – noradrenaliin i/v	<input type="checkbox"/> MAP ≥ 65 mm Hg
6 tundi	<b>Verekülvid ja antimikroobse ravi alustamine</b>	
	<input type="checkbox"/> Vähemalt kahed verekülvid veeni või arteri punktsioonil. Teiste kehavedelike külvid	
	<input type="checkbox"/> Empiiriline AB-ravi. Üks või enam preparaati vastavalt kahtlustatavale infektsioonikoldele ja kohalikule AB-ravi juhendile	
	<b>Infektsioonikolde kindlakstegemine</b>	
<input type="checkbox"/> Vereanalüüsid: happe-aluse tasakaal, laktaat, hemogramm 5-osalise leukogrammiga, kliinilise keemia analüüsid		
<input type="checkbox"/> Radioloogilised uuringud vastavalt kliinilise diagnoosi hüpoteesile		
<b>Infektsioonikolde kontroll</b>		
<input type="checkbox"/> Perkutaanne dreneerimine		
<input type="checkbox"/> Kirurgiline operatsioon		
24 tundi	<b>Elundipuudulikkuste ravi</b>	<b>Ravi eesmärgid</b>
	<input type="checkbox"/> Konsulteerige intensiivravi vajaduse suhtes, kui laktaadi absoluutväärtus on üle 4 mmol/l või laktaaditase pole langustrendis	
	<input type="checkbox"/> Hapnikravi – O <sub>2</sub> -mask...aparaadihingamine	<input type="checkbox"/> SpO <sub>2</sub> ≥ 95%
	<input type="checkbox"/> Infusioonravi – isotooniline kristalloidlahus	<input type="checkbox"/> Diurees ≥ 0,5 ml/kg/t
	<input type="checkbox"/> Juhindu dünaamilistest eelkoormuse parameetritest	<input type="checkbox"/> Laktaadi normaliseerumine
	<input type="checkbox"/> Vasopressoorne ravi – noradrenaliin i/v	<input type="checkbox"/> MAP ≥ 65 mm Hg
<input type="checkbox"/> Väikeses doosis glükokortikoidravi septilise šoki korral		