

Lisa 2.1 Abistavad küsimused ärevushäire äratundmiseks lastel ja noorukitel

- Kas laps/nooruk muretseb sageli tühisena näival põhjusel?
- Kas laps/nooruk on kurtnud kõhuvalu või kõhulahtisust, ilma et kaasneks teisi haigusele viitavaid sümptomeid?
- Kas lapsel/noorukil on esinenud perioode, mil ta käib väga sageli tualetis, kuigi analüüsid on korras?
- Kas laps/nooruk on kurtnud südameklõppimist või valu südame piirkonnas, kuigi füüsilise tegevuse ajal näib tema südametegevus täiesti korras olevat?
- Kas esineb perioode, mil laps/nooruk muutub tavalisest rahutumaks, püsimatumaks ja nutlikumaks ning vajab rohkem rahustamist?
- Kas lapsel/noorukil on esinenud äkilisi hirmusööste, millega kaasnevad kehalised kaebused ja surmahirm?
- Kas on olnud perioode, mil laps/nooruk klammerdub lähedaste külge ega lase neid hetkekski vaateväljast kaugemale?
- Kas lapsele/noorukile meeldib teiste ees esineda?
- Kas lapsele/noorukile meeldib koolis üksi tahvli ees vastata?
- Kas lapsele/noorukile meeldivad uudsed olukorrad?
- Kas laps/nooruk pabistab olukordades, kus hinnatakse tema oskusi või teadmisi?
- Kas laps/nooruk püüab vältida olukordi, milles temaealised tunnevad ennast tavaliselt hästi?