

Lisa 5. Regionaalanalgeesia

Lokaalanesteetikum (aminoamiidid)	Lahuse kontsentratsioon (mg/ml)	Maksimaalne ühekordne annus mg/kg kohta	Kasutamine	Infiltratsioon-anesteesia kestus	Maksimaalne ööpäevane annus
Lidokaiin		4,5 mg/kg (kuni 300 mg)	Lokaalselt, infiltratsioon, perifeersete närvide blokaad, epiduraalselt, IVRA	30–60 min	2400 mg
1%	10	ehk 0,45 ml/kg			
2%	20	ehk 0,2 ml/kg			
Bupivakaiin		2 mg/kg (kuni 175 mg)	Infiltratsioon, intratekaalselt, epiduraalselt, närviblokaadid	120–240 min	400 mg
0,50%	5	ehk 0,4 ml/kg			
Bupivakaiin + epinefriin		3 mg/kg (kuni 225 mg)	Infiltratsioon	180–240 min	400 mg
0,5 % + 0,0005%	5 + 0,005	ehk 0,6 ml/kg			
	ehk adrenaliini 5 mkgr/ml				
Ropivakaiin		2,5 mg/kg (kuni 300 mg)	Infiltratsioon, epiduraalselt, närviblokaadid	120–240 min	675mg või kuni 28 mg/tunnis
0,20%	2	ehk 1,25 ml/kg			ehk 14 ml/t
0,75%	7,5	ehk 0,3 ml/kg			
Epiduraalanalgeesia segu		kuni 15 ml	4–14 ml/t vaj. boolus 4 ml		400 ml
Bupivacain 0,5% – 10 ml	1				
Fentanüül 0,005% 4 – 5 ml	4–5 mkgr/ml				
NaCl 0,9 % ad 50 ml					

Kasutatud allikad

- Gropper MA, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, Leslie K. Miller's Anesthesia. 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.
- Hadzic A. Hadzic's Textbook of Regional Anesthesia and Acute Pain Management. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Education; 2017.
- Ropivakaiin. Ravimi omaduste kokkuvõtted. <https://www.ravimiregister.ee/?pv=PublicSearchResult> (kasutatud 12.05.2025).
- Bupivakaiin. Ravimi omaduste kokkuvõtted. <https://www.ravimiregister.ee/?pv=PublicSearchResult> (kasutatud 12.05.2025).