



Lisa 13. Lamatishaavandi infektsioonitunnuste hindamine

II astme lamatishaavand	III–IV astme lamatishaavand
NERDS-skaala	STONEES-skaala
Kasutatakse pindmiste krooniliste haavandite infektsioonitunnuste hindamisel. Lamatishaavandi puhul kasutatakse II astme korral .	Kasutatakse sügavate krooniliste haavandite infektsioonitunnuste hindamisel. Lamatiste puhul kasutatakse III ja IV astme korral .
	
N (<i>non-healing</i>) – haavand ei parane; haavandi suurus ei ole nelja nädala jooksul vähenenud 20–40% võrra.	S (<i>size</i>) – haavandi pindala suurenemine
E (<i>exudate</i>) – eritise suurenemine; üle 50% haavasidemest on eritise läbi imbunud	T (<i>temperature</i>) – ümbritseva naha temperatuuri tõus üle 1,5°C
R (<i>red + bleeding</i>) – punetav ja veritsev haavand; haavapõhja kude on erepunane ja hüpergranulatsiooniga, õrn granulatsioonikude veritseb puudutusel	O (<i>os</i>) – haavand ulatub luuni
D (<i>debris</i>) – nekrootiline kude; hallikas granulatsioonikude, koorikute ja nekrootilise/ elujõuetu kude haavandis	N (<i>new</i>) – tekkivad uued haavandid või satelliitkolded
S (<i>smell</i>) – tugev ja ebameeldiv lõhn	E (<i>erythema & exudate</i>) – punetav nahk või turse haavandi ümbruses
	S (<i>smell</i>) – tugev ja ebameeldiv lõhn
NB! Kolme või enama tunnuse esinemine näitab, et haavand on infitseerunud.	NB! Kolme või enama tunnuse esinemine näitab, et haavand on infitseerunud.