

	<b>Bioloogiline ravi</b>	<b>Ravi Januse kinaasi inhibiitoriga (JAK-inhibiitoriga)</b>
<b>Kontrollanalüüsid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hemogramm 5-osalise leukogrammiga</li> <li>• settekiirus</li> <li>• CRP</li> <li>• kreatiniin</li> <li>• ALAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hemogramm 5-osalise leukogrammiga</li> <li>• settekiirus</li> <li>• CRP</li> <li>• kreatiniin</li> <li>• ALAT</li> </ul>
<b>Analüüside võtmise sagedus</b>	TÄISKASVANU (>18 a): iga 3 kuu järel LAPS [0–18 a (k.a)]: lastereumatoloogi või reumaõe vastuvõtul iga 2–3 kuu järel	4–6 nädalat pärast ravi alustamist, edasi iga 3 kuu järel
<b>Ravi katkestamise näidustused</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• leukopeenia/aneemia/trombotsütopeenia/pantsütopeenia</li> <li>• neerufunktsiooni oluline langus</li> <li>• ALAT taseme vähemalt 3-kordne tõus</li> <li>• infektsioon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• leukopeenia/aneemia/trombotsütopeenia/pantsütopeenia</li> <li>• ALAT taseme vähemalt kolmekordne tõus</li> <li>• oluline neerufunktsiooni langus</li> <li>• seedetrakti haavand</li> <li>• infektsioon</li> </ul>
<b>Ravi katkestamine enne plaanilist operatsiooni</b>	4–8 nädalat (v.a Rituximab 20–24 nädalat) enne operatsiooni	2–3 päeva enne operatsiooni
<b>Ravi katkestamine enne planeeritavat rasedust</b>	otsustatakse reumatoloogi ja günekoloogi koostöös	

Allikas: Bijlsma JWJ, Hachulla E *et al.* EULAR Textbook on Rheumatic Diseases, 3rd ed; 2018.