

Immunsupressioonravi					
	Metotreksaat (Trexan)	Leflunomiid (Arava)	Sulfasalatsiin (Salazopyrin)	Hüdroksüklorokiin (Plaquenil)	LAPS 0–18 a (k.a): asatiopriin (Imuran)
Vereanalüüsid	hemogramm 5-osalise leukogrammiga (nn kliiniline veri), settekiirus, CRP, kreatiniin, ALAT			ei ole vaja	hemogramm 5-osalise leukogrammiga, settekiirus, CRP, kreatiniin, ALAT
Muud analüüsid ja uuringud	albumiini ja kreatiniini suhe uriinis	vererõhk	ei ole vaja	<u>Silmaarsti kontroll:</u> TÄISKASVANU ( $\geq 18$ a): pärast 5 aastat kestnud ravi 1 kord aastas LAPS (0–18 a): esimese 5 aastal jooksul pärast JIA diagnoosi panemist 2 korda aastas, edasi kord aastas	ei ole vaja
Analüüside võtmise sagedus	TÄISKASVANU ( $>18$ a): esimene kontroll 4 nädalat pärast ravi alustamist, edasi iga 3 kuu järel LAPS [0–18 a (k.a)]: 2 nädalat ja 1 kuu pärast ravi alustamist, edasi iga 2–3 kuu järel			<u>Silmaarsti kontroll:</u> TÄISKASVANU ( $>18$ a): pärast 5 aastat kestnud ravi 1 kord aastas LAPS [0–18 a (k.a)]: esimese 5 aastal jooksul pärast JIA diagnoosi panemist 2 korda aastas, edasi 1 kord aastas	2 nädalat ja 1 kuu pärast ravi alustamist, edasi iga 2–3 kuu järel
Ravi katkestamise näidustused	<ul style="list-style-type: none"> <li>leukopeenia/aneemia/trombotsütopeenia/pantsütopeenia</li> <li>neerufunktsiooni oluline langus</li> <li>ALAT taseme vähemalt kolmekordne tõus</li> <li>aktiivne seedetrakti haavand</li> <li>infektsioon</li> </ul>			<u>Silmaarsti</u> poolt haigusloos dokumenteeritud hüdroksüklorokiinist (Plaquenil) tingitud muutused silmapõhjades	<ul style="list-style-type: none"> <li>leukopeenia/aneemia/trombotsütopeenia/pantsütopeenia</li> <li>neerufunktsiooni oluline langus</li> <li>ALAT taseme vähemalt 3-kordne tõus</li> </ul>
Ravi katkestamine enne plaanilist operatsiooni	TÄISKASVANU ( $>18$ a): <ul style="list-style-type: none"> <li>pole vajalik plaanilise ortopeedilise operatsiooni korral</li> <li>suure septilise riskiga operatsiooni korral 15 päeva enne operatsiooni</li> </ul> LAPS [0–18 a (k.a)]: nädal enne operatsiooni	ei ole vaja	ei ole vaja	ei ole vaja	nädal enne operatsiooni
Ravi katkestamine enne planeeritavat rasedust	3 kuud (ka meeste puhul)	ei ole vaja	ei ole vaja	ei ole vaja	ei ole asjakohane

Allikas: Bijlsma JWJ, Hachulla E *et al.* EULAR Textbook on Rheumatic Diseases, 3rd ed; 2018.