

Lisa 4. Ülemise õõnesveeni kompressiooni käsitus

Ülemise õõnesveeni kompressioon

Kaebused:

- hingeldus
- näo ja kaela, ülakeha ja käte turse
- lämbumise tunne
- pea oleks nagu „paks“
- peavalu
- rindkere valu
- kõha
- düsfaagia
- kognitiivne häire
- hallutsinatsioonid
- krambid

Kliiniline pilt:

- torakalveenide laienemine
- kaelaveenide laienemine
- näo turse
- tahhüpnöe
- tsüanoos
- käte turse
- striidor
- kooma

Healoomuline (10%)

Põhjus:

- tsentraalveeni kateeter
 - südamestimulaator
- kiiritusravijärgne fibroos
 - struuma
- kopsutuberkuloos

- voodipeatsi tõstmine
- lisahapnik, kui patsient tunneb sellest leevendust
- põhjuse kõrvaldamine
- antikoagulatsioon madalmolekulaarse hepariiniga

Pahaloomuline (90%)

Põhjus:

- intratorakaalne primaarne kasvaja
 - 80% (kopsuvähk, mesoteliom)
 - mediastinaalne lümfadenopaatia (metastaasid, lümfoom)

- voodipeatsi tõstmine
 - lisahapnik, kui patsient tunneb sellest leevendust
 - deksametasoon
 - 16 mg x 1 (8 mg x 2) p.o., iv, jätkata 8 mg x 1 (4 mg x 2) p.o., iv hommikul ja lõunal
 - antikoagulatsioon madalmolekulaarse hepariiniga
- Onkoloogi konsultatsioon võimalike täiendavate ravivõtete suhtes (kiiritusravi, keemiaravi, stentimine)

Kui täiendavaid ravivõtteid ei ole võimalik rakendada või patsient on terminalses seisundis –
vaevuste leevendamine

Lühendid: p.o. - suu kaudu; iv - intravenoosselt